


RECOMANACIONS PER A DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ

D'UNA GASTROSCÒPIA




- A causa de la introducció d'aire al tub digestiu per a la realització de la prova, pot notar molèsties abdominals i inflor després de l'exploració. Habitualment desapareixen en poc temps.
- Pot començar a beure líquids a partir de les 2 hores després de la prova (evitar líquids calents, els pot prendre tebis o freds). Pot continuar la resta del dia amb la ingesta d'aliments tous.
- Per a fer l'exploració, se li ha administrat una medicació sedant que pot alterar els reflexos durant diverses hores després de l'administració, de manera que en les properes 6-12 hores hauria d'evitar:
 - Conduir (cap tipus de vehicle)
 - Treballar
 - Manejar maquinària perillosa
 - Prendre decisions amb possible repercussió legal

Acudir al Servei d'Urgències si apareix:

- Dolor abdominal intens persistent
- Febre elevada les 24-48 hores posteriors a la prova
- Sagnat important o persistent entre les 24 hores i els 10-15 dies posteriors a la prova.

RECOMENDACIONES PARA DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN

DE UNA GASTROSCOPIA



- Debido a la introducción de aire en el tubo digestivo para la realización de la prueba, puede notar molestias abdominales e inflor después de la exploración. Habitualmente desaparecen en poco tiempo.
- Puede empezar a beber líquidos a partir de las 2 horas después de la prueba (evitar líquidos calientes, los puede tomar tibios o fríos). Puede continuar el resto del día con la ingesta de alimentos blandos.
- Para hacer la exploración, se le ha administrado una medicación sedante que puede alterar los reflejos durante varias horas después de la administración, de manera que en las próximas 6-12 horas debería evitar:
 - Conducir (ningún tipo de vehículo)
 - Trabajar
 - Manejar maquinaria peligrosa
 - Tomar decisiones con posible repercusión legal

Acudir al Servicio de Urgencias si aparece:

- Dolor abdominal intenso persistente
- Fiebre elevada las 24-48 horas posteriores a la prueba
- Sangrado importante o persistente entre las 24 horas y los 10-15 días posteriores a la prueba.